

**ENFERMEDAD POR VIRUS  
CHIKUNGUNYA**

**PROTOCOLO PARA LA VIGILANCIA**

**EN LA COMUNITAT VALENCIANA**

## ÍNDICE

<b>1.- DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD .....</b>	<b>3</b>
<b>2.- VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD .....</b>	<b>5</b>
<b>3.- MEDIDAS DE SALUD PÚBLICA .....</b>	<b>8</b>
<b>4.- BIBLIOGRAFIA .....</b>	<b>11</b>
<b>Anexo I (Encuesta epidemiológica).....</b>	<b>13</b>
<b>Anexo II (Diagnóstico de enfermedad por virus de CHIKUNGUNYA).....</b>	<b>17</b>

## 1.- DESCRIPCION DE LA ENFERMEDAD.-

### Introducción

La Fiebre Chikungunya es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos que se caracteriza por la aparición repentina de fiebre, escalofríos, cefalalgia, anorexia, conjuntivitis, lumbalgia y/o artralgias graves. La artralgia o artritis afecta principalmente a las muñecas, rodillas, tobillos y articulaciones pequeñas de las extremidades, puede ser de bastante intensidad y dura desde algunos días hasta varios meses. En muchos pacientes (60% - 80%), la artritis inicial va seguida, entre 1 y 10 días después, por una erupción maculo-papulosa. La erupción cutánea cede en el término de 1 a 4 días y va seguida por descamación fina. Es común que se presenten mialgia y fatiga, y cursa con linfadenopatía, trombocitopenia, leucopenia y alteración de las pruebas hepáticas. En general tiene una resolución espontánea. Los síntomas desaparecen generalmente entre los 7 y 10 días, aunque el dolor y la rigidez de las articulaciones pueden durar más tiempo. Si bien lo más habitual es que la recuperación se produzca sin secuelas, en zonas endémicas es frecuente que los pacientes experimenten una recaída presentando malestar general, inflamación de las articulaciones y tendones, incrementando la incapacidad para actividades de la vida diaria. Las principales complicaciones son los trastornos gastrointestinales, la descompensación cardiovascular o la meningoencefalitis. Se ha registrado algún caso mortal principalmente en pacientes de edad avanzada o en casos en los que el sistema inmunológico estaba debilitado.

El primer brote epidémico se describió en el 1952 en Tanzania. A partir de los años cincuenta se han identificado varios brotes epidémicos en zonas de Asia y en África, donde la enfermedad es endémica. Algunos de los brotes más importantes notificados más recientemente en ambas regiones ocurrieron en las islas del Océano Índico (Isla Reunión e Islas Mauricio), donde el mosquito *Aedes albopictus* fue el vector principal (años 2005-2006); y en la India, donde tanto *Aedes aegypti* como *Aedes albopictus* actuaron como vectores (año 2006). En los últimos años, han surgido nuevos brotes epidémicos en diferentes países en África y sobre todo en Asia, como el brote detectado en Indonesia en los años 2011-2012.

Hasta el verano de 2007, todos los casos que se produjeron en Europa fueron importados. En los últimos años, se está registrando un aumento de estos casos importados de Fiebre por el virus Chikungunya en Europa. En agosto del 2007, se notificaron los primeros casos autóctonos de la enfermedad en Europa, en la localidad costera italiana de Ravena, en Emilia

Romagna, en un brote epidémico con transmisión local que ocasionó 197 casos y donde el vector implicado fue el mosquito *Aedes albopictus*. En 2010 se detectó por segunda vez la transmisión local en Europa, notificándose dos casos autóctonos en Francia. Aunque actualmente el virus Chikungunya en Europa no es endémico, la presencia de vectores competentes en diferentes regiones de España y otros países mediterráneos, Alemania, Holanda e Isla de Madeira, y la introducción del virus a partir de casos importados en casi todos los países de la región europea son condiciones que favorecen que pueda producirse una transmisión local.

### **Agente**

El virus del Chikungunya (CHIKV) pertenece al género *Alphavirus*, de la familia *Togaviridae*. Pertenece al complejo viral antigénico *Semliki Forest* que también contiene los virus *Mayaro*, *O'nyong-nyong* y *Ross River*. El virus Chikungunya posee un ciclo selvático, que se da predominantemente en África. A partir de aquí se cree que emergió dando lugar a tres genotipos: Este Africano, Este/Centro Africano y Asiático. A lo largo de los años el virus se ha expandido por el mundo y ha sufrido diferentes mutaciones genéticas que le han permitido adaptarse a las nuevas condiciones epidemiológicas y vectoriales.

### **Reservorio**

- El reservorio es el hombre en periodos epidémicos.
- Fuera de los periodos epidémicos, los primates no humanos y algunos otros animales salvajes como murciélagos, roedores, pájaros u otros vertebrados actúan como reservorio.

### **Modo de transmisión**

**1.- El virus Chikungunya se transmite a través de la picadura de un vector, principalmente mosquitos del género *Aedes*:** Clásicamente, la enfermedad era endémica en Asia, Océano Índico y en África, donde se distribuían principalmente sus vectores transmisores. A lo largo de los años, el mosquito *Aedes albopictus*, se ha introducido en nuevos continentes, alcanzando Oceanía (Australia, Nueva Zelanda), América (EEUU, América Central y del Sur), otras áreas del continente Africano (Sudáfrica, Nigeria, Camerún) y también Europa. En Europa, el mosquito *Aedes albopictus* se introdujo por primera vez en Albania, y posteriormente se ha distribuido por casi todos los países de la costa mediterránea. En España

se identificó por primera vez en 2004 en San Cugat del Vallés, y se encuentra ampliamente diseminado en la zona costera de Cataluña. También se ha detectado en algunos puntos de la Comunitat Valenciana, donde se encuentra en plena expansión, en la Comunidad Autónoma de Murcia y en Baleares.

**2.- Teóricamente, el virus puede ser transmitido por transfusión, trasplante de tejidos, órganos y células,** si bien hasta hoy no se ha descrito ningún caso secundario a transfusión; sí se ha referido infección por exposición a sangre.

**3.- La transmisión vertical se ha notificado en algunos brotes epidémicos como el que ocurrió en la Isla Reunión en 2006.**

#### **Periodo de incubación**

El periodo de incubación dura entre 4 y 7 días (puede variar entre 1-12 días).

#### **Periodo de transmisibilidad**

No se ha demostrado transmisión directa de persona a persona. En los seres humanos, el periodo virémico se extiende desde el inicio de síntomas hasta el quinto o sexto día posteriores (incluso hasta 10 días) permitiendo que el vector se alimente y pueda transmitir la enfermedad durante ese periodo.

#### **Susceptibilidad**

La susceptibilidad es universal. Son comunes las infecciones subclínicas, especialmente en los niños, entre quienes es raro que se presente enfermedad manifiesta. En general, la evolución es a la recuperación, aunque en algunos casos puede tardar varios meses, y va seguida de una inmunidad homóloga duradera. La persistencia de los síntomas está asociada a mayor edad.

## **2.- VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.-**

#### **Objetivos**

1. Detectar los casos importados con el fin de establecer las medidas de prevención y control para evitar la aparición de casos secundarios y de notificar la actividad viral en el lugar de la infección.
2. Detectar de forma temprana los casos autóctonos, para orientar las medidas de control y evitar la circulación del virus, sobre todo en áreas con presencia de un vector competente.

## Definición de caso

### 1.- Criterio clínico

Aparición aguda de fiebre mayor de 38,5°C, y artralgia grave/discapacitante que no puedan ser explicados por otros diagnósticos clínicos.

2.- Criterio de laboratorio. Al menos UNO de los siguientes criterios de confirmación:

- aislamiento del virus en muestra clínica
- presencia de ácido nucleico viral en una muestra clínica
- presencia de anticuerpos IgM e IgG específicos en una única muestra de suero.
- seroconversión a anticuerpos específicos del virus con aumento de cuatro veces el título en muestras recogidas con al menos de una a tres semanas de separación.

El aislamiento del virus y la detección del ácido nucleico se pueden realizar desde el inicio de síntomas, ya que la viremia es detectable desde el inicio de síntomas hasta aproximadamente el quinto día de enfermedad.

La IgM específica aumenta y es detectable a partir del cuarto o quinto día del comienzo de síntomas, puede persistir durante muchos meses, sobre todo en pacientes con artralgias de larga duración. Se han comunicado reacciones serológicas cruzadas entre alphavirus.

En el anexo II se incluye la información específica sobre diagnóstico de laboratorio de un caso de Chikungunya.

### 3.- Criterio epidemiológico

- La infección ha tenido lugar al mismo tiempo y en la misma zona donde se han producido otros casos confirmados de Fiebre por el virus Chikungunya.
- Residir o haber visitado áreas endémicas en los 15 días anteriores a la aparición de los síntomas.

## Clasificación de los casos

1.-Caso sospechoso: Persona que cumple los criterios clínicos.

2.-Caso probable: Persona que cumple los criterios clínicos y algún criterio epidemiológico.

3.-Caso confirmado: Persona que cumple los criterios clínicos, con o sin criterios epidemiológicos y que cumplen algún criterio de confirmación de laboratorio.

**Caso importado:** Persona que satisfaga algún criterio de confirmación de laboratorio y que haya estado en el extranjero en una zona endémica o en la que se haya detectado la circulación del virus, al menos 15 días antes del inicio de síntomas.

**Caso autóctono:** Cuando no haya antecedente de viaje a zona endémica en los 15 días anteriores al inicio de síntomas.

**Definición de brote:** Dos o más casos, que tengan relación epidemiológica.

## MODO DE VIGILANCIA

La Enfermedad vírica del Chikungunya es una Enfermedad de Declaración Obligatoria (EDO) individualizada, que lleva asociada la notificación de los casos y la cumplimentación de la encuesta epidemiológica del programa AVE.

Los casos importados confirmados se notificarán semanalmente con información individualizada, según las variables del formulario de declaración del AVE.

Cuando se trate de un caso autóctono probable o confirmado, se considerará como “adquisición de una enfermedad en una zona hasta entonces libre de ella” y por tanto se convierte en una alerta de salud pública. Por esta razón, la declaración será urgente al Servicio de Vigilancia.

Si se detecta un caso autóctono se realizará una investigación epidemiológica con la finalidad de establecer la cadena de transmisión a nivel local y descartar otros casos autóctonos relacionados. Los datos recogidos orientarán la investigación entomológica que deberá comenzar tras la detección de un caso autóctono.

En las zonas con presencia de vector competente para la transmisión de la enfermedad, se reforzará la vigilancia durante el periodo de actividad del vector. Según los datos disponibles actualmente, este periodo se establece desde el 1 mayo al 30 noviembre. Durante este periodo se llevará a cabo una búsqueda activa de casos sospechosos y confirmación por laboratorio de los mismos. Si se detecta en estas zonas un caso de fiebre Chikungunya importado se iniciará una investigación epidemiológica con la finalidad de detectar una posible transmisión autóctona.

En caso de brote se enviará el informe final en un periodo de tiempo no superior a tres meses después de que haya finalizado su investigación.

### 3.- MEDIDAS DE SALUD PÚBLICA.-

#### Medidas preventivas

Las medidas preventivas de Salud Pública difieren en función del riesgo de transmisión según la presencia o ausencia del vector competente (*Ae. albopictus*) en las diferentes zonas de España.

En relación a estas *medidas ambientales encaminadas al control vectorial*, se deberían realizar periódicamente estudios comunitarios para precisar la densidad de la población de mosquitos, reconocer los hábitats con mayor producción de larvas, y, promover programas para su eliminación, control o tratamiento con los mecanismos apropiados. Por otro lado, dado que es una enfermedad emergente, es muy importante la sensibilización tanto de la población general como de los profesionales sanitarios.

La educación dirigida a la población general es fundamental para que participe en las actividades de control en el ámbito peridoméstico, debido al comportamiento específico del vector transmisor. Se recomienda el desarrollo de herramientas de comunicación con mensajes preventivos específicos enfocados a reducir las superficies donde se facilite el desarrollo del mosquito (recipientes donde se acumule el agua, jardines y zonas verdes de urbanizaciones cercanas a las viviendas, fugas, charcos, residuos, etc.)

De la misma manera, es importante que *los profesionales sanitarios* estén informados del potencial riesgo de que se produzcan casos por esta enfermedad ya que facilitaría la detección precoz de los casos, mejoraría el tratamiento y el control de la enfermedad.

Además, si se **confirmara un caso autóctono** en el territorio o se detectará transmisión local, todos los sectores de la comunidad deben implicarse en las acciones para la prevención y control de esta enfermedad: educativos, sanitarios, ambientales, infraestructuras, etc.

En este caso, *a nivel individual*, la protección frente a la picadura de mosquito es la principal medida preventiva. Se utilizarían repelentes tópicos en las partes descubiertas del cuerpo y sobre la ropa. Algunos de eficacia probada son los repelentes a base de DEET (N, N-dietil-m-toluamida), permitido en niños mayores de 2 años y en embarazadas en concentraciones inferiores al 10%. También se puede utilizar otros con diferentes principios activos, Icaridin-Propidina (icaridin) y el IR3535® (etil-butil-acetil-aminopropionato). El uso de mosquiteras en puertas y ventanas contribuiría a disminuir la población de mosquitos en el interior de las viviendas, sobretodo durante el día y manteniéndolas cerradas. También es importante la lucha individual frente el mosquito en la zona peridoméstica.



## Medidas ante un caso, sus contactos y medio ambiente

### 1.- Control del caso

No existe tratamiento específico ni profilaxis. Se llevará a cabo el tratamiento sintomático y vigilancia de las complicaciones.

Dado que no se transmite persona-persona, se tomarán las precauciones estándar en el medio sanitario.

Con el fin de prevenir la transmisión a nivel local, se tratará de evitar el contacto del caso con los mosquitos mediante la protección individual frente a la picadura de mosquitos a través de mosquiteras en la cama y repelentes eficaces, especialmente, en zonas de circulación del vector. El uso del aire acondicionado y los repelentes eléctricos pueden ayudar a reducir este contacto.

### 2.- Control del contacto y del medio ambiente

No existen contactos como tales, ya que no se transmite persona a persona.

Si se detecta un **caso autóctono** o un **caso importado** en una **zona con vector competente** en el **periodo de actividad del vector**, se procederá a la búsqueda activa de nuevos casos. Esta búsqueda activa se realizará mediante una investigación de nuevos casos en el sitio de residencia del paciente durante las dos semanas previas al comienzo de la enfermedad. Se alertará a los servicios médicos de Atención Primaria y Especializada del territorio epidémico definido para que se tenga en cuenta este posible diagnóstico y detectar casos que hayan pasado inadvertidos. El territorio epidémico se definirá según la extensión del vector competente y las características del brote. Se mantendrán estas actividades de búsqueda activa durante los 45 días posteriores al inicio de los síntomas del último caso declarado (este período corresponde al doble de la duración media del ciclo de transmisión del virus, desde el momento en el que el mosquito pica al humano - periodo de incubación de 15 días- hasta el final de la viremia en el hombre -periodo de viremia de 7 días-). En el caso de ser autóctono, además de esta búsqueda activa se realizará también una investigación de nuevos casos en el lugar de residencia del paciente durante las dos semanas previas al comienzo de la enfermedad.

En relación con las **medidas ambientales**, se recomienda una investigación entomológica y se procederá a una intervención rápida ambiental mediante la lucha antivectorial en la vivienda del caso y alrededores.

## Otras medidas de salud pública

### 1.- Medidas de precaución para las donaciones de sangre

El Comité Científico de Seguridad Transfusional ha regulado las principales recomendaciones en relación a las donaciones de sangre de personas que han visitado áreas afectadas, así como de los residentes en las mismas (Acuerdos 18-10-2006 27-06-2007). La mayoría de zonas en las que se detecta el CHIKV son al mismo tiempo zonas endémicas de paludismo por lo que quedarían excluidas de la donación al quedar incluidas dentro de los criterios de exclusión del paludismo. Además, las personas provenientes de zonas en las que existe el virus, pero no paludismo, como es el caso de las Islas Reunión, Mauricio y Seychelles entre otras, serán excluidas durante 4 semanas (28 días) desde su regreso, y si han presentado o se ha sospechado fiebre de CHIKV durante su estancia en la zona, o a su regreso, se excluirán durante 6 meses.

Estas medidas se revisarán y ampliarán en caso de confirmación de transmisión local en una zona de España.

### 2.- Recomendaciones a viajeros

Se recomienda la información a los viajeros que se dirijan a zonas endémicas sobre el riesgo de infección, el modo de transmisión, la sintomatología y el periodo de incubación. Se comunicará a estos viajeros la importancia de acudir al médico si se produce fiebre y artralgias que no se deban a otra causa médica, dentro de los 15 días siguientes a abandonar la zona endémica. En la siguiente dirección se actualiza la información mundial referente a las zonas afectadas por esta enfermedad:

<http://www.cdc.gov/chikungunya/map/index.html>.

#### 4.- BIBLIOGRAFÍA.-

- Organización Panamericana de la Salud. Preparación y Respuesta ante la eventual introducción del virus chikungunya en las Américas. 2011. Washington, D.C.: OPS.
- Angelini R, et al. An outbreak of chikungunya fever in the province of Ravenna, Italy. Euro Surveill 12.9 (2007): E070906.
- Aranda C, Eritja R, and Roiz D. First record and establishment of the mosquito *Aedes albopictus* in Spain. Med Vet Entomol. 20.1 (2006): 150-52.
- Collantes F and JA Delgado. Primera cita de *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Skuse, 1894) en la región de Murcia. Anales de Biología 33 (2011): 99-101.
- Delacour-Estrella S, et al. Detección de *Aedes (Stegomyia) albopictus* Skuse 1894 (Diptera; Culicidae) en Benicàssim. Primera cita para la provincia de Castellón (España). Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa (SEA) 47 (2010): 440.
- Eritja R, et al. Worldwide invasion of vector mosquitoes: present European distribution and challenges for Spain. Biological Invasions 7 (2005): 87-89.
- European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report 2011 - Reporting on 2009 surveillance data and 2010 epidemic intelligence data. Stockholm: ECDC. 2011. Ref Type: Report.
- Fritel X, et al. Chikungunya virus infection during pregnancy, Reunion, France, 2006. Emerg Infect Dis. 16.3 (2010): 418-25.
- Global Alert and Response (GAR). Disease Outbreaks News. 2012. <http://www.who.int/csr/don/en/index.html>.
- Jupp P G and McIntosh BM. *Aedes fuscifer* and other mosquitoes as vectors of chikungunya virus at Mica, northeastern Transvaal, South Africa. J Am Mosq Control Assoc. 6.3 (1990): 415-20.
- La, Ruche G., et al. First two autochthonous dengue virus infections in metropolitan France, September 2010. Euro Surveill. 15.39 (2010): 19676.
- Roiz, D., et al. Distribución de *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Skuse, 1894) (Diptera, Culicidae) en España. Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa 1.40 (2007): 523-26.
- Seyler T, et al. Assessing the risk of importing dengue and chikungunya viruses to the European Union. Epidemics. 1.3 (2009): 175-84.
- Simon F, et al. Chikungunya virus infection. Curr Infect Dis Rep. 13.3 (2011): 218-28.

- Straetemans M. Vector-related risk mapping of the introduction and establishment of *Aedes albopictus* in Europe. *EuroSurveill.* 13.7 (2008): 8040.
- Thiboutot M, et al. Chikungunya: a potentially emerging epidemic? *PLoS Negl.Trop Dis* 4.4 (2010): e623.
- Werner D, et al. Rapid Communication: Two invasive mosquito species, *Aedes albopictus* and *Aedes japonicus japonicus*, trapped in south-west Germany, July to August 2011. *Euro Surveill.* (2012).
- Wolfe N D, et al. Sylvatic transmission of arboviruses among Bornean orangutans. *Am JTrop Med Hyg.* 64.5-6 (2001): 310-16.
- European Centre for Disease Prevention and Control. Fiebre por Chikungunya, información para profesionales sanitarios. Disponible en:
- [http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/chikungunya\\_fever/basic\\_facts/Pages/factsheet\\_health\\_professionals.aspx](http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/chikungunya_fever/basic_facts/Pages/factsheet_health_professionals.aspx)

**Anexo I**  
**Encuesta epidemiológica**

La información contenida en esta encuesta es confidencial y su uso es estrictamente sanitario (Ley 14/1986, General de Sanidad, art. 10.3)

**ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDAD POR VIRUS CHIKUNGUNYA**

**DATOS DECLARANTE**

Fecha de declaración del caso \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Semana \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_  
Declarante \_\_\_\_\_ Centro de trabajo \_\_\_\_\_  
Teléfono \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_  
Punto de declaración \_\_\_\_\_  
Procedencia: EPI [ ] Preventiva [ ] Médico privado [ ] RedMIVA [ ] Búsqueda activa [ ] SIA [ ] Otros [ ]

**ASIGNACIÓN DEL CASO, referido al territorio de riesgo (sólo cumplimentar cuando difiere del punto de declaración)**

Municipio \_\_\_\_\_ Departamento \_\_\_\_\_

**IDENTIFICACIÓN DEL CASO, datos de filiación**

Nombre \_\_\_\_\_ Primer Apellido \_\_\_\_\_ Segundo Apellido \_\_\_\_\_  
SIP \_\_\_\_\_ Historia Clínica \_\_\_\_\_  
Fecha de nacimiento \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Edad \_\_\_\_\_ años [ ] meses [ ] días [ ] Sexo: Hombre [ ] Mujer [ ]  
Domicilio \_\_\_\_\_ Municipio \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_ Teléfonos \_\_\_\_\_  
Ocupación \_\_\_\_\_ Empresa (Colegio) \_\_\_\_\_  
Sección (curso/aula) \_\_\_\_\_ Dirección empresa (Colegio) \_\_\_\_\_  
Municipio (empresa/colegio) \_\_\_\_\_ Teléfonos \_\_\_\_\_  
Paciente extranjero: Sí [ ] Año llegada \_\_\_\_\_ Fecha llegada \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ País nacimiento \_\_\_\_\_  
No [ ]  
Observaciones \_\_\_\_\_

**DATOS CLÍNICOS**

Fecha de inicio de los primeros síntomas \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Fecha de diagnóstico / de sospecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Descripción clínica**

Signos/Síntomas	SÍ	NO	NC
Anorexia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Artritis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conjuntivitis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Escalofríos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lumbalgia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Signos/Síntomas	SÍ	NO	NC
Artralgia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cefalea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erupción cutánea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fiebre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otros síntomas: (Citar): \_\_\_\_\_

**Ingreso en hospital:** Sí [ ] No [ ] Desconocido [ ] Fecha de hospitalización: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Fecha de alta hospitalaria: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Centro \_\_\_\_\_ Servicio \_\_\_\_\_

**Complicaciones:** Sí  No  (Citar): \_\_\_\_\_ Desconocido

**Evolución:** Curación  Secuelas  Especificar \_\_\_\_\_  
Fallecimiento  Fecha fallecimiento \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Otra  Especificar \_\_\_\_\_ Desconocida

**DATOS DE LABORATORIO**

**Fecha de diagnóstico de laboratorio:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Agente causal:** Virus Chikungunya

**Tipo de Muestra** (marcar una de las siguientes opciones):

Sangre  LCR  Otras

**Prueba** (marcar las que correspondan):

Aislamiento  Ácido nucleico  Detección IgM  Detección IgG  Seroconversión

**Envío de muestra al Laboratorio Nacional de Referencia (LNR):** Sí  No

Identificador de muestra del declarante al LNR: \_\_\_\_\_

Identificador de muestra en el LNR: \_\_\_\_\_

**DATOS EPIDEMIOLÓGICOS**

**CASO:** Pertenece a BROTE  Caso aislado  Agregación  Pendiente  Desconocido

**IDENTIFICACIÓN DEL BROTE:** \_\_\_\_\_

**TIPO DE CASO:** Autóctono  Importado  País \_\_\_\_\_

Extracomunitario  C. Autónoma \_\_\_\_\_ Pendiente  Desconocido

**CLASIFICACIÓN CASO:** Sospechoso  Confirmado  Error Diagnóstico  Pendiente  Desconocido

**Ocupación de riesgo** (marcar una de las siguientes opciones):

Medioambiental: agua  Medioambiental: animal  Medioambiental: suelo

**Exposición** (marcar la principal de las siguientes opciones):

Contacto con animal como vector/vehículo de transmisión

Ha recibido: transfusiones o hemoderivados, hemodiálisis, transplantes..., sin especificar

Persona a Persona: Madre-Hijo. Es un recién nacido de madre infectada o portadora

**Animal sospechoso** (marcar una de las siguientes opciones):

Mono  Mosquito  Roedor  Otro animal

**Ámbito de exposición** (marcar una de las siguientes opciones):

Aguas costeras  Alcantarillado  Boscoso  Fosa séptica  Fuente  Humedal

Inundación  Lago  Pozo  Río  Rural  Selvático  Terreno encharcado  Urbano

**Datos de viaje:**

Viaje durante el periodo de incubación: Sí  No

**Datos de viaje:**

Viaje durante el periodo de incubación: Si [  ] No [  ]

Lugar del viaje:

País: \_\_\_\_\_ Fecha de ida: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Fecha de vuelta: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Motivo de estancia en país endémico (marcar una de las siguientes opciones):

Inmigrante recién llegado [  ]    Trabajador temporal [  ]    Visita familiar [  ]    Turismo [  ]    Otro [  ]

Observaciones: \_\_\_\_\_



**Anexo II**  
**DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO DE UN CASO DE CHIKUNGUNYA**

## ANEXO-II.- DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO DE UN CASO DE CHIKUNGUNYA

La técnica diagnóstica de elección depende de la fase de la enfermedad en la que se encuentre el paciente en el momento de acudir al servicio de salud.

**Se podrán enviar muestras de los casos al Laboratorio de Referencia del Centro Nacional de Microbiología, para la confirmación del diagnóstico virológico y/o serológico.**

- Si el paciente acude en la fase aguda, primeros 7 días tras el inicio de síntomas. Se realizarán ensayos de PCR y detección de IgM
- Si el paciente acude en la fase de convalecencia, a partir de los 7 días del inicio de síntomas. Se realizarán preferiblemente ensayos de detección de anticuerpos IgM e IgG. En este caso será necesario recoger una segunda muestra con un intervalo de 15 días.

### Tipo de Muestras:

- Serología: **suero**
- PCR: Preferentemente **suero**.
- En casos con presencia de síntomas neurológicos: enviar LCR y suero.

### Transporte de muestras:

Envío de la muestra refrigerada ( 2-8 °C) lo más rápidamente posible ( < 24hs), o congelada (evitar congelación/descongelación), si se prevé una demora mayor a 24 hs.

Se utilizará la aplicación informática **GIPI**. El envío de las muestras se realizará a través del Programa de Vigilancia de Enfermedades Víricas Transmitidas por Vectores, la cual es sin costo para el hospital/centro que envía la muestra. La dirección y teléfonos de contacto son:

### La dirección y teléfonos de contacto son:

Área de Orientación Diagnóstica  
Centro Nacional de Microbiología  
Instituto de Salud Carlos III  
Carretera Majadahonda-Pozuelo, km 2  
28220 Majadahonda-Madrid-ESPAÑA  
Tfo: 91 822 37 01 - 91 822 37 23- 91 822 3694  
CNM-Área de Orientación Diagnóstica <cnm-od@isciii.es>