

**DEPARTAMENTO HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA
UNIDAD DE ENFERMERIA DERMATOLOGICA, ÚLCERAS Y HERIDAS**

TABLA RECOMENDACIONES CURAS QUEMADURAS SEGÚN GRADO

GRADO	OBSERVACIONES	LIMPIEZA	DESBRIDAMIENTO	TRATAMIENTO	PAUTA CURA
I	Eritema con dolor	Solución salina	No	Hidratación/espuma de hidrocortisona	Cada 12 horas
II	Flictenas y necrosis de epidermis	Solución salina	Retirada de epidermis (valorar la retirada a las 24 horas)	Hidrofibra, Hidrocoloide extrafino o en maya, Sulfadiazina argéntica	Cada 24 horas
II profundo	Afectación dérmica	Solución antiséptica jabonosa y solución salina	Retirada de epidermis y pequeños esfacelos	Hidrofibra, Hidrocoloide extrafino o en maya, Sulfadiazina argéntica. Protección apósitos antibacterianos (Ag), hidrogeles	Cada 24 horas (los primeros días) Cada 3 días vigilar
III	Necrosis subdermica, aspecto acartonado y duro a la palpación	Solución antiséptica jabonosa y solución salina	Desbridamiento de necrosis	Hidrofibra, Sulfadiazina argéntica. Protección apósitos antibacterianos (Ag), hidrogeles	Cada 3 días vigilar

La hospitalización no sólo dependerá del grado y etiología sino del tanto por cien de su extensión, pero siempre será en adultos desde un 15 a 25% y niños con un 10% y cuando son en cara, cuello, manos, perine, escroto:

9% cabeza. 18% Tórax o abdomen, 18% (2) brazos, 36% (2) piernas, 1% genitales. (Regla de los múltiplos de 9