


# GUÍA DE PRACTICA CLINICA SOBRE EL MANEJO DEL PACIENTE CON DISPEPSIA (536.8)

-Guía de práctica clínica sobre el manejo del paciente con dispepsia: Aten Primaria. 2012;**44(12):727.e1---727.e38**

- IV Conferencia Española de Consenso sobre el tratamiento de la infección por *Helicobacter pylori*. Gisbert JP, et al. Gastroenterol Hepatol. 2016.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.gastrohep.2016.05.003>

# DISPEPSIA NO INVESTIGADA



OJO! 1 mes sin Antibiótico y 15 días sin IBP

\*Información, medidas higiénico-dietéticas, modificar estilos de vida, relación empática.

# Protocolo TAUKIT®

OJO! 1 mes sin Antibiótico y 15 días sin IBP

## Protocolo de TAUKIT®



1

ADULTOS: Disolver el sobre de Citral Pylori® en 200 ml de agua.  
NIÑOS: Disolver el sobre de Citral Pylori® en 200 ml de agua. Administrar sólo 100 ml de la disolución.



2

Esperar 10 minutos



3

Recoger las muestras pre-dosis (BASAL)



4

ADULTOS: Administrar un comprimido de TAUKIT® disuelto en 125 ml de agua.  
NIÑOS: Administrar medio comprimido de TAUKIT® disuelto en 50 ml de agua.



5

Esperar 30 minutos



6

Recoger las muestras post-dosis (POST)


7




Identificación de muestras y envío para análisis

APROBADO EN  
*pediatría*


# TRATAMIENTO ERRADICADOR DE LA INFECCION POR HELICOBACTER PYLORI




# TRATAMIENTO ERRADICADOR DE LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI EN PACIENTES ALERGICOS A LA PENICILINA



# TRATAMIENTO DE LA DISPEPSIA FUNCIONAL



# Tratamiento erradicador Helicobacter Pylori



**Figura 1** Algoritmo para el tratamiento inicial y de rescate de la infección por *Helicobacter pylori*.

H: horas; IBP: inhibidor de la bomba de protones.

\* La terapia cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol) podría ser una alternativa como tratamiento erradicador de primera línea, una vez que su eficacia sea confirmada en nuestro medio.

† Existe una nueva formulación con todos los antibióticos incluidos en una única cápsula.

# La tetraciclina clorhidrato/hidrocloruro por separado no está comercializada en España; se puede emplear en su lugar doxiciclina (100 mg/12 h), aunque la experiencia es mucho más limitada y existen dudas sobre su equivalencia terapéutica.

§ Se sugiere reevaluar cuidadosamente la necesidad de erradicar la infección.