

PROTOCOLO DE PROFILAXIS QUIRÚRGICA EN CIRUGÍA PLÁSTICA

OBJETIVO: Descripción de los protocolos de profilaxis antibiótica en pacientes sometidos a cirugía plástica.

ALCANCE: Paciente candidato a cirugía plástica.

DESCRIPCIÓN: Este documento está dirigido a:

- ✓ Personal de enfermería de cuidados.
- ✓ Personal de enfermería del quirófano.

ADMINISTRACIÓN DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA SEGÚN TIPO DE CIRUGÍA:

Grupo 1: Cirugía cutánea superficial y exéresis mucosas (ej. exéresis simples, colgajos locales, injertos) → No antibióticos

Grupo 2: Procedimientos limpios (cabeza y cuello, mama, extremidades, linfadenectomía, nervio periférico) → No antibióticos. Excepto:

- Si ASA ≥ 3 o duración prevista de cirugía $>3h$ → Cefazolina 2 gr iv. 60 minutos antes de la cirugía^a
- Alérgicos: Clindamicina 600 mg iv^b

Grupo 3: Microcirugía, cirugía protésica, hernia incisional o cirugía limpia osteoarticular no protésica → Cefazolina 2gr iv. 60 minutos antes de la cirugía^a

- Alérgicos: Clindamicina 600 mg iv^b

Grupo 4: Cirugía limpia-contaminada (cavidad oral, genitourinaria): Amoxicilina-Clavulánico 2gr iv^a. Si duración de cirugía $>7h$ repetir a las 3h y 15h tras la primera dosis.

- Alérgicos: Clindamicina 600 mg iv^b + Gentamicina 80 mg iv (no repetir gentamicina)

^a Repetir si la duración del procedimiento es $>3h$ o si pérdida hemática es >1500 mL

^b Repetir si la duración del procedimiento es $>6h$ o si pérdida hemática es >1500 mL