

Protocolo de profilaxis quirúrgica antimicrobiana del Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial

<i>Intervención *</i>	<i>Sin riesgo de endocarditis bacteriana</i>	<i>Riesgo elevado de endocarditis bacteriana (+)</i>
<i>Extracción dentaria simple</i>	Colutorio de clorhexidina al 0.2%	Amoxicilina 2 gr v.o. 1 hora antes de la exodoncia. Si alergia, clindamicina 600 mg v.o. 1 hora antes de la exodoncia (a)
<i>Cirugía oral sobre tejidos blandos con anestesia local (biopsias o biopsia-extirpación)</i>	Amoxicilina 500-750 mg/8horas v.o. durante 7 días. Si alergia, clindamicina 300 mg/8 horas v.o. durante 7 días.	(a) más Amoxicilina 500-750 mg/8horas v.o. durante 7 días. Si alergia, clindamicina 300 mg/8 horas v.o. durante 7 días.
<i>Cirugía oral sobre dientes y hueso con anestesia local</i>	Amoxicilina+ ac. clavulánico 875/125 mg/8 horas v.o. durante 7 días. días. Si alergia, clindamicina 300 mg/8 horas v.o. durante 7 días.	(a) más Amoxicilina+ ac. clavulánico 875/125 mg/8 horas durante 7 días. Si alergia, clindamicina 300 mg/8 horas v.o. durante 7 días.
<i>Cirugía oral con anestesia general sin ingreso</i>	Amoxicilina+ ac. clavulánico 1000/200 mg I.V en una dosis antes de la inducción anestésica. Posteriormente, amoxicilina+ ac. clavulánico 875/125 mg/8 horas v.o. durante 7 días. Si alergia, clindamicina 600 mg IV en una dosis antes de la inducción anestésica. Posteriormente, clindamicina 300 mg/8 horas v.o. durante 7 días.	Amoxicilina+ ac. clavulánico 2000/200 mg I.V en una dosis antes de la inducción anestésica. Posteriormente, amoxicilina+ ac. clavulánico 875/125 mg/8 horas v.o. durante 7 días. Si alergia, clindamicina 600 mg IV en una dosis antes de la inducción anestésica. Posteriormente, clindamicina 300 mg/8 horas v.o. durante 7 días.
<i>Cirugía oral o maxilofacial con anestesia general con ingreso</i>	Amoxicilina+ ac. clavulánico 1000/200 mg IV en la inducción anestésica y cada 8 horas mientras dure el ingreso. Posteriormente, amoxicilina+ ac. clavulánico 875/125 mg/8 horas V.O. durante el tiempo que estime el facultativo responsable. Si alergia, Clindamicina 600 mg I.V. en la inducción anestésica y cada 8 horas durante el tiempo que dure el ingreso. Posteriormente, clindamicina 300 mg/8 horas v.o. durante el tiempo que estime el facultativo responsable.	Amoxicilina+ ac. clavulánico 2000/200 mg I.V en una dosis antes de la inducción anestésica. Posteriormente, seguir con mg I.V./8 horas mientras dure el ingreso. Posteriormente, seguir con Amoxicilina+ ac. clavulánico 875/125 mg/8 horas v.o. durante el tiempo que estime el facultativo responsable. Si alergia, clindamicina 600 mg IV en una dosis antes de la inducción anestésica y cada 8 horas durante el tiempo que dure el ingreso. Posteriormente, clindamicina 300 mg/8 horas v.o. durante el tiempo que estime el facultativo responsable.

*Todas las intervenciones sobre la cavidad oral, son por definición, contaminadas. + Son situaciones de riesgo elevado de endocarditis bacteriana: portadores de prótesis valvulares de cualquier tipo, endocarditis bacteriana previa, cardiopatías congénitas complejas y shuntis pulmonares quirúrgicos