

PROTOCOLO DE PROFILAXIS QUIRÚRGICA ANTIBIÓTICA EN GINECOLOGÍA:

- 1.- CIRUGÍA MENOR: Cefazolina 1gr iv 1 hora antes de la intervención dosis única; en alergias Fosfomicina 4gr iv (dosis única).
 - .- Conización
 - .- Legrado ginecológico.
 - .- Histeroscopia quirúrgica.
 - .- Extirpación o marsupialización de glándula de Bartholino o quistes vulvares.
 - .- Ninfectomía.
 - .- Intervenciones de incontinencia urinaria: ALE, TOT, TVT.

- 2.- CIRUGÍA MEDIA: Cefazolina 1 gr iv 1 hora antes de la intervención dosis única; en alergia Fosfomicina 4gr iv .(dosis única).
 - .- Quistectomías abdominales.
 - .- Esterilización tubárica.
 - .- Plastias vaginales.
 - .- En alergias a Betalactámicos, en caso de EPI(enfermedad pélvica inflamatoria):
Clindamicina 900mg iv/8h + Gentamicina 240mg iv/24h.

- 3.- CIRUGÍA MAYOR: Cefazolina 1gr iv 1 hora previa y se continua 1gr iv c/8h x 24h o Fosfomina 4 gr iv. y otra dosis a las 24h.
 - .- Endometriosis profunda.
 - .- Fijación del ligamento sacroespinoso.
 - .- Histerectomía vaginal.
 - .- Histerectomía abdominal con/sin anexectomía mediante laparotomía o laparoscopia.
 - .- Intervenciones oncológicas.
 - .- En caso de lesión rectal, en alergias a Betalactámicos: Clindamicina 900mg iv/8h + Gentamicina 240mg iv /24h.